



TRANQ DOPE:

药物供应之甲苯噻嗪



“TRANQ”是指用甲苯噻嗪稀释的阿片类药物的俚语

甲苯噻嗪为一种兽用镇静剂，目前尚未被批准用于人类。

- 甲苯噻嗪并非阿片类药物，对纳洛酮 (Narcan) 没有反应
- 不过，仍可使用纳洛酮以逆转任何阿片类药物过量的相关作用

服用甲苯噻嗪后有何感觉？

服用甲苯噻嗪 1 至 2 分钟后，就能感觉到相关效果，且效果可持续 4 小时以上。

- 深度镇静/使劲点头，尤其是在使用后的前 20 至 30 分钟内
- 心率、血压和呼吸频率降低
- 口干
- 皮肤溃疡 - 大面积、严重、愈合不良的伤口，且皮肤可能变黑和坏死
- 因血糖快速下降或贫血而感觉头晕、疲倦、虚弱或意识混乱

芝加哥甲苯噻嗪过量致死人数

2019 年	21
2020 年	23
2021 年	89
2022 年	112

来源：芝加哥以甲苯噻嗪为主因的致死人数临时数据，摘自库克县法医办公室开放数据门户网站。数据截至 2023 年 3 月 15 日，后续可能有变。

使用甲苯噻嗪会导致出现亟需复杂伤口护理的严重皮肤伤口：

- 伤口面积大，且皮肤和组织可能坏死
- 注射相关部位、非注射相关部位以及非注射人群身上都可能出现（通常位于腿部、前臂）
- 不具传染性，但可能受感染
- 愈合不良或久不愈合

如何处理因使用甲苯噻嗪而导致的伤口：

- 尽量减少或停止使用甲苯噻嗪
- 不要抓挠皮肤
- 使用肥皂和清水，尽量保持伤口清洁
- 立即就医



TRANQ DOPE:

药物供应之甲苯噻嗪



甲苯噻嗪于何处发现?

大多数甲苯噻嗪发现于麻醉剂和/或阿片类药物中,但亦有涉及甲苯噻嗪和可卡因、甲基苯丙胺和苯二氮卓类的药物过量致死案例报告

如果服用甲苯噻嗪过量,该怎么办?

- 服用纳洛酮。注意:甲苯噻嗪对纳洛酮 (Narcan) 没有反应,但必须使用纳洛酮以逆转阿片类药物过量的作用
- 拨打 911
- 将某人置于复原体位,并试着清理其气管
- 如果愿意,尝试进行人工呼吸

针对甲苯噻嗪使用过量,尚无被批准用于人类的解毒剂。

来源

- 如需免费获取纳洛酮 (Narcan), 请前往芝加哥公共图书馆发放点: bit.ly/FindNarcan
- 如需免费获取更安全的相关用品,其中包括注射器、鼻吸套件、吸烟套件、芬太尼检测包、HIV 和丙型肝炎检测以及鼻腔/肌内纳洛酮 (Narcan), 请联系芝加哥恢复联盟: **(773) 367-3771**
- 如需立即为所有人提供阿片类药物使用障碍治疗(无需保险、身份证或其他证件), **请拨打 833-234-6343** 并呼叫 **MAR NOW**。该服务每周 7 天、全天 24 小时开通,同时提供交通服务。
- 发送电子邮件至 osu.cdph@cityofchicago.org 以申请芬太尼检测包和 Narcan。

注意:甲苯噻嗪戒断可能持续数天至数周,其主要症状是严重焦虑