

# ورقة حقائق الفينتانيل

- يعد الفينتانيل مادة أفيونية أقوى **من الهيروين بـ 50 مرة**.
- عند صنع الفينتانيل بصورة غير قانونية، يأتي في شكل مسحوق أبيض/رمادي اللون يمكن حقنه أو تدخينه أو استنشاقه
- يوجد الفينتانيل في الميث والكوكايين والهيروين وحبوب أخرى.
- **عند تعاطي جرعة زائدة من الفينتانيل، يتطلب الأمر تناول جرعة أكبر من نالوكسون (ناركان) لعكس تأثير الجرعة الزائدة.**
  - لا يقاوم الفينتانيل تأثير نالوكسون (ناركان).
  - لا يمكنك تعاطي جرعة زائدة بمجرد لمس الفينتانيل.
  - إذا لم تعكس جرعة نالوكسون الأولى الأعراض الناجمة عن تعاطي جرعة زائدة خلال دقيقتين إلى 3 دقائق، يلزم إعطاء جرعة ثانية.
- **للحد من خطر الجرعة الزائدة:** استخدم العقاقير بتأن وبكمية أقل وباعد بين الجرعات. احرص على التعاطي بصحبة شخص آخر واحرص على توفر نالوكسون (ناركان) لديك دائماً.
- تتضمن علامات تعاطي جرعة زائدة: التنفس البطيء والضعيف والاختناق وضعف الجسم وشحوب/ازرقاق/برودة الجلد وغلبة النعاس أو فقدان الوعي وصغر حجم حدقة العين إلى حد كبير. **اتصل بـ 911 إذا كنت تعتقد أن أحد الأشخاص يمر بحالة تعاطي جرعة زائدة**

اتصل بخط المساعدة الخاص بتعاطي الأفيونات في إلينوي على الرقم:

**1-833-2-FINDHELP**

