

DOXY-PEP CONTRA LAS INFECCIONES DE TRANS- MISIÓN SEXUAL 101

¿CUALQUIER PERSONA PUEDE USAR DOXY-PEP COMO



TRATAMIENTO A ITS?

3

Los datos revelan que únicamente aplica a adultos homosexuales, bisexuales, y hombres que tienen sexo con hombres (GBMSM), así como mujeres transgénero. Los estudios en mujeres cisgénero y en adolescentes están en curso.

¿QUÉ NECESITO SABER SOBRE LA DOXICICLINA COMO DOXY-PEP COMO TRATAMIENTO A ITS?



5

Los pacientes que utilicen la doxy-PEP contra ITS deberán de mantener una rutina regular de prueba para mantener su salud sexual, incluyendo pruebas cada 3 meses para la gonorrea, clamidia, sífilis, y VIH (si no sabe que tiene VIH.) Si la persona que está usando doxy-PEP es diagnosticada con ITS, deberán de ser tratados de acuerdo a las guías establecidas* por 2021 CDC STI.

*Encuentre la guía aquí:

cdc.gov/std/treatment-guidelines/default.htm



¿CÓMO PUEDO CONCIENTIZAR SOBRE DOXY-PEP CONTRA ITS?

7

Es conocida como un medicamento que tiene varios años, sin embargo se le considera como una nueva intervención. Organizadores comunitarios, proveedores, y DIS necesitan que tomar una perspectiva proactiva para informar a pacientes sobre la doxy-PEP contra ITS. Considere una campaña de concientización a miembros comunitarios, socios comunitarios, para construir concientización entre la población, además de considerar el trabajar con proveedores y farmacias que pueden informar sobre el medicamento y así vencer cualquier barrera.

¿QUÉ ES EL MEDICAMENTO DOXY-PEP CONTRA LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)?



1

La doxiciclina es una manera efectiva y nueva de prevenir cualquier bacteria causada por ITS, los pacientes pueden reducir el riesgo de adquirirla al tomar doxiciclina.

¿QUÉ TAN EFECTIVA ES DOXY-PEP CONTRA ITS?



2

Un estudio de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicado en abril del 2023 en un diario de medicina de Inglaterra, encontró que la doxy-PEP al tomarla como profilaxis luego de haber sido expuesto a ITS logra reducir:

- Sífilis en un 87%
- Clamidia en un 88%
- Gonorrea en un 55% en individuos que tomaron PrEP VIH.

Además la doxy-PEP redujo:

- Sífilis en un 77%
 - Clamidia en un 74%
 - Gonorrea en un 57% en personas que tienen VIH.
- (Fuente: N Engl J Med 2023; 388:1296-1306)



¿CÓMO ES QUE LOS PACIENTES PUEDEN USAR DOXY-PEP CONTRA ITS?

4

- La doxiciclina es una píldora que está disponible únicamente por prescripción.
- Es ideal tomar 200 mg. de doxiciclina en un periodo de 24 horas pero no mayor a 72 horas después de haber tenido sexo oral, anal, o vaginal sin protección.
- La doxiciclina se puede tomar a diario, dependiendo de la frecuencia de la actividad sexual, pero los pacientes no deben de tomar más de 200 mg. en un periodo de 24 horas.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA DOXICICLINA?



6

Además de informar a los pacientes sobre los beneficios preventivos de tomar doxiciclina como STI PEP, los proveedores deberán de informar a los pacientes sobre posibles efectos secundarios incluyendo, **fatotoxicidad, síntomas gastrointestinales, y ulceración esofágica.**