


طفح جلدي بسيط

الحصبة ليست مجرد

الحصبة مرض خطير، خاصةً على الرضع والأطفال الصغار.



تشمل أعراض الحصبة عادةً ما يلي:



الطفح الجلدي



احمرار العين أو

زيادة إفراز الدموع (يتطور بعد 3-5 أيام من بدء ظهور الأعراض) في العينين أو كلاهما



سيلان الأنف



السعال



الحُمى

(قد تصل درجة حرارة الجسم إلى 104 درجات فهرنهايت)

الحصبة مرض خطير.

يمكن أن تسبب الحصبة مضاعفات صحية شديدة الخطورة، مثل الالتهاب الرئوي والوذمة الدماغية (التهاب الدماغ) وحتى الوفاة.

يُصاب طفل واحد من بين كل 20 طفل مصاب بالحصبة بالالتهاب الرئوي، وتُعد حالات الوفاة بسبب هذا المرض أكثر شيوعًا بين الأطفال الصغار.



سيتم احتجاز 1 من كل 5 أشخاص مصابون بالحصبة في المستشفى.



يموت ما بين 1 إلى 3 أشخاص من كل 1000 شخص مصاب بالحصبة.



يُصاب 1 من بين كل 1000 شخص مصاب بالحصبة بالوذمة الدماغية، التي قد تؤدي إلى تلف الدماغ.



الحصول على اللقاح هو الطريقة المثلى للوقاية من الإصابة بمرض الحصبة

يجب أن يمنح الطفل الذي يتراوح عمره بين 12 و15 شهرًا لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، ثم تعطى الجرعة الثانية عندما يتراوح عمر الطفل بين 4 و6 سنوات. تبلغ فاعلية جرعتين من اللقاح 97% في الوقاية من الحصبة.

تقدم عيادات إعطاء اللقاح التابعة لـ

CDPH Immunization خدماتها لجميع سكان شيكاغو. وقد يطلب منك تقديم سند الإقامة للاطلاع عليه.

[CHICAGO.GOV/VACCINES](https://chicago.gov/vaccines)



إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور على جهة تطعيم أخرى، فيرجى زيارة:

[VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/](https://VFC.Illinois.gov/search/)

الحصبة مرض شديد العدوى

وتنتشر الإصابة من خلال الرذاذ الذي يخرج في الهواء عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس. يمكن أن يصيب الشخص المصاب بالحصبة 9 من أصل 10 من مخالطيه إذا لم يتلقوا اللقاح.



[CHICAGO.GOV/MEASLES](https://chicago.gov/measles)