

麻疹

它可不只是轻微皮疹。



麻疹可能很危险，尤其对婴儿和幼童而言。

麻疹的症状一般包括：



高烧

(可能高达摄氏 104°F 以上)



咳嗽



流鼻涕



眼睛发红及/或流泪



皮疹

(在症状出现 3 到 5 天后发疹)

麻疹可能引发严重并发症。

麻疹可能引发严重健康并发症，包括肺炎、脑部肿胀（脑炎），甚至死亡。




每 5 名 麻疹患者中，**1 人** 需住院治疗。



每 20 名 麻疹患者中，**1 人** 会感染肺炎（幼儿因麻疹死亡的最常见原因）。



每 1000 名 麻疹患者中，**1 人** 会出现脑部肿胀，可能导致脑损伤。



每 1000 名 麻疹患者中，**1 至 3 人** 会死亡。

麻疹具有高度传染性

当感染者咳嗽或打喷嚏时，病毒会透过空气传播。一名麻疹患者可将病毒传染给周围 90% 未接种疫苗的人。

接种疫苗是预防麻疹的最佳方式

儿童应于 12 至 15 个月大及 4 至 6 岁接种麻疹/流行性腮腺炎/德国麻疹 (Measles-Mumps-Rubella, MMR) 疫苗。接种两剂后，预防麻疹的有效性达 97%。

芝加哥公共卫生局 (Chicago Department of Public Health, CDPH) 疫苗接种门诊为所有芝加哥居民提供服务。可能会要求您出示居住证明。

CHICAGO.GOV/VACCINES



若需协助查找其他疫苗接种提供者，请访问：

VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/



CHICAGO.GOV/MEASLES

