


麻疹

它可不只是輕微皮疹。



麻疹可能很危險，尤其對嬰兒和幼童而言。

麻疹的症狀一般包括：




高燒

(可能高達攝氏 104°F 以上)



咳嗽



流鼻涕



眼睛發紅及/或流淚



皮疹

(在症狀出現 3 到 5 天後發疹)

麻疹可能引發嚴重併發症。

麻疹可能引發嚴重健康併發症，包括肺炎、腦部腫脹（腦炎），甚至死亡。



每 5 名 麻疹患者中，**1 人** 需住院治療。



每 20 名 麻疹患者中，**1 人** 會感染肺炎（幼兒因麻疹死亡的最常見原因）。



每 1000 名 麻疹患者中，**1 人** 會出現腦部腫脹，可能導致腦損傷。



每 1000 名 麻疹患者中，**1 至 3 人** 會死亡。

麻疹具有高度傳染性

當感染者咳嗽或打噴嚏時，病毒會透過空氣傳播。一名麻疹患者可將病毒傳染給周圍 90% 未接種疫苗的人。

接種疫苗是預防麻疹的最佳方式

兒童應於 12 至 15 個月大及 4 至 6 歲接種麻疹/流行性腮腺炎/德國麻疹 (Measles-Mumps-Rubella, MMR) 疫苗。接種兩劑後，預防麻疹的有效性達 97%。

芝加哥公共衛生局 (Chicago Department of Public Health, CDPH) 疫苗接種門診為所有芝加哥居民提供服務。可能會要求您出示居住證明。

CHICAGO.GOV/VACCINES



若需協助查找其他疫苗接種提供者，請造訪：

VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/



CHICAGO.GOV/MEASLES

