


سرخکان

صرف دانچه خورد نیست

سرخکان میتواند خطرناک باشد، مخصوصاً برای نوزادان و اطفال خردسال.



علائم سرخک معمولاً شامل موارد زیر است:



دانچه

(3-5 روز بعد از شروع علائم بوجود میاید)



چشم های سرخ
و/یا آب پر



ریزش بینی



سرفه



تب بالا

(درجه حرارت بدن ممکن به بیشتر از 104°F یا 1 یابد)

سرخکان می تواند جدی باشد.

سرخکان میتواند سبب عوارض شدید صحتی بشمول سینه بغل، تورم مغزی (انسفالیت) و مرگ گردد.

1 از هر 20 طفل مبتلا به سرخکان به سینه بغل مبتلا میشوند که معمولترین علت مرگ ناشی از سرخکان در اطفال جوان است.



1 از 5 نفر که به سرخکان مبتلا میشوند در شفاخانه بستری خواهند شد.



1 تا 3 از 1,000 نفر مبتلا به سرخکان خواهند مرد.



1 از هر 1,000 نفر مبتلا به سرخکان دچار تورم مغزی خواهند شد که ممکن است منجر به آسیب مغزی شود.



واکسیناسیون بهترین روش برای جلوگیری از مریضی سرخکان است

یک طفل باید در سنین 12-15 ماهگی و 4-6 سالگی واکسین سرخکان-کله چرک-روبیلا (MMR) را دریافت کند. دو دوز 97% در مقابل سرخکان موثر است.



کلینیک های واکسیناسیون اداره صحت عامه شیکاگو (Chicago Department of Public Health, CDPH) به تمام باشندگان خدمات فراهم میسازد. ممکن است از شما خواسته شود که سند سکونت خود را نشان دهید.

CHICAGO.GOV/VACCINES



اگر شما در شناسایی یک ارائه دهنده دیگر واکسیناسیون نیاز به کمک دارید، لطفاً به ذیل مراجعه کنید:

VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/



سرخکان خیلی ساری است

و زمانی که یک شخص مصاب سرفه می کند یا عطسه می زند از طریق هوا پخش میشود. یک شخص مبتلا به سرخکان میتواند آنرا به 9 از 10 نفر واکسین نشده اطراف خود انتقال دهد.



CHICAGO.GOV/MEASLES