


سرخک

سرخک تنها یک بثورات پوستی ساده نیست.

سرخک می‌تواند خطرناک باشد، به ویژه برای نوزادان و کودکان خردسال.



علائم سرخک معمولاً شامل موارد زیر است:



بثورات پوستی
(که 3 تا 5 روز بعد از شروع سایر علائم ظاهر می‌شود)



قرمزی و/یا آبریزش چشم



آبریزش بینی



سرفه



تب بالا
(که ممکن است به بیش از 104 درجه فارنهایت برسد)

سرخک می‌تواند بیماری جدی باشد.

سرخک می‌تواند به عوارض جدی سلامتی، از جمله ذات‌الریه، التهاب مغز (آنسفالیت) و حتی مرگ منجر شود.

از هر 20 کودک مبتلا به سرخک، 1 نفر دچار ذات‌الریه می‌شود که شایع‌ترین علت مرگ ناشی از سرخک در کودکان خردسال است.



از هر 5 نفری که به سرخک مبتلا می‌شوند، 1 نفر در بیمارستان بستری می‌شود.



از هر 1,000 نفر مبتلا به سرخک، 1 تا 3 نفر جان خود را از دست می‌دهند.



از هر 1,000 نفر مبتلا به سرخک، 1 نفر دچار تورم مغزی می‌شود که ممکن است منجر به آسیب مغزی شود.



واکسیناسیون بهترین راه برای پیشگیری از سرخک است.

کودکان باید واکسن سرخک، اوریون، و سرخچه (measles, mumps, and rubella, MMR) را در سنین 12 تا 15 ماهگی و 4 تا 6 سالگی دریافت کنند. دو دوز واکسن 97 درصد در برابر سرخک مؤثر است.

کلینیک‌های واکسیناسیون CDPH به تمام ساکنان Chicago خدمات ارائه می‌دهند. ممکن است از شما خواسته شود که مدرک اقامت خود را ارائه دهید.



CHICAGO.GOV/VACCINES

در صورت نیاز به راهنمایی جهت یافتن مرکز واکسیناسیون دیگر، لطفاً به وبسایت زیر مراجعه کنید:



VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/

سرخک به شدت واگیردار است

و با سرفه یا عطسه فرد مبتلا، به آسانی در هوا پخش می‌شود. یک فرد مبتلا به سرخک می‌تواند این بیماری را به 9 نفر از هر 10 نفر واکسینه‌شده‌ای که در اطرافش هستند منتقل کند.



CHICAGO.GOV/MEASLES