


# ROUGEOLE

CE N'EST PAS UNE SIMPLE PETITE ÉRUPTION CUTANÉE



La rougeole peut être dangereuse, surtout pour les bébés et les jeunes enfants.

Les symptômes de la rougeole sont généralement les suivants :



**Forte fièvre**  
(peut dépasser 40 °C [104 °F])



**Toux**



**Nez qui coule**



**Yeux rouges ou larmoyants**



**Éruption cutanée**  
(apparaît 3 à 5 jours après le début des symptômes)

## La rougeole peut être grave.

La rougeole peut entraîner de graves complications, notamment une pneumonie, un gonflement du cerveau (encéphalite) et la mort.




**1 personne sur 5** atteinte de la rougeole devra être hospitalisée.



**1 enfant sur 20** atteint de la rougeole contractera une pneumonie, qui est la cause la plus fréquente de décès dû à la rougeole chez les jeunes enfants.



**1 personne sur 1 000** atteinte de la rougeole développe un gonflement du cerveau qui peut entraîner des lésions cérébrales.



**1 à 3 personnes sur 1 000** atteintes de la rougeole mourront.

### La rougeole est très contagieuse

et se propage par voie aérienne lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. Une personne atteinte de la rougeole peut la transmettre à neuf personnes non vaccinées sur dix autour d'elle.

## La vaccination est le meilleur moyen de prévenir la rougeole

Un enfant doit être vacciné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à l'âge de 12 à 15 mois et de 4 à 6 ans. Deux doses sont efficaces à 97 % contre la rougeole.

Les cliniques de vaccination du CDPH offrent leurs services à tous les habitants de Chicago. Il pourra vous être demandé de fournir une preuve de résidence.

**CHICAGO.GOV/VACCINES**



Si vous avez besoin d'aide pour trouver un autre prestataire de vaccination, veuillez consulter :

**VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/**



**CHICAGO.GOV/MEASLES**

