


شري

دا يوازي لږې ګرېمکې نه دي

شري خطرناک کيدی شي، په ځانګړې توګه کوچنيانو او ماشومانو لپاره.



د شري په علايمو کې
لاندې ذکر شوي شامل دي:



بخار

(د علايمو تر پيلېدو
3-5 ورځې وروسته
څرګندېږي)



سري او يا
اوبلنې سترګې



بهبډونکې پوزه



توخی



لوړه تبه

(ممکن تر 104°F ډېر
لوړه شي)

شري جدي دی.

شري د شديدو روغتيايي اختلاطاتو سبب کېږي لکه سينه بغل، د مغز پړسوب (انسفالايټس) او مرګ.

له هرو 20 کسانو څخه 1 پر شري اخته ماشوم سينه بغل،
په تنګيو ماشومانو کې د مرګ تر ټولو عام لامل پيدا کوي.



له 5 کسانو څخه 1 په شري اخته کسبه په روغتون
کې بستر کېږي.



له هرو 1000 کسانو څخه له 1 تر 3 پر شري اخته
کسمره کېږي.



له هرو 1000 کسانو څخه 1 پر شري اخته کس د مغز
پړسوب پيدا کوي چې ښايي د مغز خرابېدو سبب شي.



واکسين د شري د مخنيوي تر ټولو غوره لار ده.

ماشوم بايد د شري، ډيډغوري او روبېلا (measles, mumps, and rubella, MMR) واکسين په 12-15 مياشتو او 4-6 کلنۍ کې ولگوي.
دوه ډوزه د شري پر وړاندې 97% اغېزمن دي.

د The Chicago Department of Public Health (CDPH) د واکسينو کلينکونه د Chicago
ټولو اوسېدونکو لپاره خدمتونه چمتو کوي. ښايي له تاسو
وغوښتل شي چې د اوسېدنې ثبوت ورکړئ.

[CHICAGO.GOV/VACCINES](https://chicago.gov/vaccines)



که چيرې د واکسينو د بل چمتو کوونکي په
پېژندلو کې مرستې ته اړتيا لرئ، ن په مهرباني
سره ليدنه وکړئ.

[VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/](https://vfc.illinois.gov/search/)



شري ډېر ساري دی

او کله چې پر دغې ناروغۍ يو
اخته کس توخيزي يا پرنجی
کوي، نو د هوا له لارې
خپرېږي. پر شري يو اخته کس
په شاوخوا کې ياده ناروغي له
10 څخه 9 غېر واکسين شوو
کسانو ته خپروي.



[CHICAGO.GOV/MEASLES](https://chicago.gov/measles)