


ODRA

TO NIE TYLKO LEKKA WYSYPKA



Odra może być groźna, szczególnie dla niemowląt i małych dzieci.

Do typowych objawów odry należą:



Wysoka gorączka
(może przekraczać 40°C)



Kaszel



Katar



Zaczerwienienie i/lub łzawienie oczu



Wysypka
(rozwija się po 3–5 dniach od wystąpienia pierwszych objawów)

Odra może mieć poważny przebieg.

Odra może powodować poważne powikłania zdrowotne, w tym zapalenie płuc, obrzęk mózgu (zapalenie mózgu), a także śmierć.



U 1 na 5 chorych na odrę niezbędna jest hospitalizacja.



U 1 na 20 dzieci chorych na odrę rozwija się zapalenie płuc, najczęstsza przyczyna zgonu przy odrze u małych dzieci.



U 1 na 1000 chorych na odrę występuje obrzęk mózgu, który może prowadzić do uszkodzenia mózgu.



1–3 na 1000 chorych na odrę umiera.

Odra jest chorobą wysoce zaraźliwą,

która przenosi się drogą kropelkową, gdy zarażona osoba kaszle lub kicha. Jedna osoba chora na odrę może zarazić nawet 9 na 10 niezaszczepionych osób w swoim otoczeniu.

Najlepszym sposobem zapobiegania zachorowaniu na odrę są szczepienia.

Dziecko powinno otrzymać szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce (measles-mumps-rubella, MMR) w wieku 12–15 miesięcy i 4–6 lat. Dwie dawki chronią przed odrą ze skutecznością na poziomie 97%.

Kliniki Wydziału Zdrowia Publicznego w Chicago (Chicago Department of Public Health, CDPH) realizujące szczepienia oferują świadczenia dla wszystkich mieszkańców Chicago. Możemy poprosić o okazanie potwierdzenia miejsca zamieszkania.

CHICAGO.GOV/VACCINES

W razie potrzeby uzyskania pomocy w znalezieniu innego podmiotu realizującego szczepienia odwiedź stronę:

VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/



CHICAGO.GOV/MEASLES

