


# SARAMPIÓN

## NO ES SOLO UN SIMPLE SARPULLIDO



**El sarampión puede ser peligroso, en especial para los bebés y los niños pequeños.**

**Los síntomas del sarampión normalmente incluyen:**



**Fiebre alta**  
(puede superar los 104 °F)



**Tos**



**Goteo nasal**



**Ojos rojos o llorosos**



**Sarpullido**  
(aparece 3-5 días después de que empiezan los síntomas)

**El sarampión puede ser grave.**

El sarampión puede causar complicaciones graves para la salud, incluyendo neumonía, inflamación del cerebro (encefalitis) y la muerte.




**1 de cada 5** personas que se contagian de sarampión son hospitalizadas.



**1 de cada 20** niños con sarampión desarrollan neumonía, la causa más frecuente de muerte por sarampión en niños pequeños.



**1 de cada 1,000** personas con sarampión desarrollan inflamación del cerebro, que puede dañarlo.



**Entre 1 y 3 de cada 1,000** personas con sarampión mueren.

**El sarampión es altamente contagioso**

y se transmite por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Una persona con sarampión puede contagiar a 9 de cada 10 personas que no estén vacunadas a su alrededor.

**Las vacunas son la mejor manera de prevenir el sarampión**

Los niños deben recibir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola (MMR) a los 12-15 meses y a los 4-6 años. Dos dosis tienen una eficacia del 97 % contra el sarampión.

Las clínicas de vacunación del CDPH prestan servicios a todos los residentes de Chicago. Es posible que se le pida que proporcione un comprobante de residencia.

**CHICAGO.GOV/VACCINES**



Si necesita ayuda para encontrar otro proveedor de vacunas, visite:

**VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/**



**CHICAGO.GOV/MEASLES**

