


КІР

ЦЕ НЕ ПРОСТО МАЛЕНЬКИЙ ВИСИП



Кір може бути небезпечним, особливо для немовлят і дітей раннього віку.

Поширені симптоми кору:



Висока температура
(може підвищуватися до більш ніж 40 °C [104 °F])



Кашель



Нежить



Почервоніння та/або сльозоточивість очей



Висипання
(починається через 3–5 днів після появи симптомів)

Кір може бути серйозним захворюванням.

Кір може спричинити серйозні ускладнення, зокрема пневмонію, набряк мозку (енцефаліт) і смерть.



1 особу з 5, хворих на кір, госпіталізують.



1 дитина з кожних 20, хворих на кір, захворіє на пневмонію – найпоширенішу причину смерті від кору серед дітей раннього віку.



В 1 особи з кожних 1000, хворих на кір, розвивається набряк мозку, що може призвести до його пошкодження.



1–3 особи з 1000, хворих на кір, помруть.

Кір – дуже заразне захворювання.

Кір поширюється повітрям, коли інфікована людина кашляє або чхає. Одна людина, хвора на кір, може заразити 9 із 10 евакцинованих осіб навколо себе.

Вакцинація – це найкращий спосіб запобігти кору.

Дитина має отримати вакцину від кору, краснухи й свинки (measles-mumps-rubella, MMR) у віці 12–15 місяців і 4–6 років. Дві дози вакцини ефективно захищають від кору на 97%.

Клініки з вакцинації Департаменту охорони здоров'я Чикаго (Chicago Department of Public Health, CDPH) надають послуги всім жителям Чикаго. Можливо, вас попросять надати докази місця проживання.

CHICAGO.GOV/VACCINES



Якщо вам потрібна допомога, щоб знайти іншого постачальника послуг із вакцинації, скористайтеся посиланням нижче.

VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/



CHICAGO.GOV/MEASLES

