

# خسرہ

## یہ صرف چھوٹا سا دانا نہیں ہے

خسرہ خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر بچوں اور چھوٹے بچوں کے لئے۔



دانے

(کہ 3 تا 5 روز بعد  
از شروع سائبر علانم  
ظاہر میشود)



سرخ اور/یا پانی  
والی آنکھیں



ناک بہنا



کھانسی



تیز بخار

(104 ڈگری فارن ہائیٹ سے  
زیادہ بڑھ سکتا ہے)

خسرہ کی علامات میں عام  
طور پر شامل ہیں:

## خسرہ سنگین ہو سکتا ہے۔

خسرہ سنگین صحت کی پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے، بشمول نمونیا، دماغ کی سوجن (انسفالٹس) اور موت۔

خسرہ میں مبتلا ہر 20 میں سے 1 بچے کو نمونیا ہوگا،  
جو چھوٹے بچوں میں خسرے سے اموات کی سب سے  
عام وجہ ہے۔



خسرہ میں مبتلا 5 میں سے 1 شخص کو اسپتال  
میں داخل کیا جائے گا۔



خسرہ میں مبتلا 1,000 افراد میں سے 1 سے 3 مر  
جائیں گے۔



خسرہ میں مبتلا ہر 1,000 میں سے ایک مبتلا  
افراد کے دماغ میں سوجن پیدا ہوگی، جس سے دماغ  
کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔



## ویکسینیشن خسرہ سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔

ایک بچے کو 12-15 ماہ اور 4-6 سال کی عمر میں  
خسرہ-ممپس-روبیلا (MMR) ویکسین لگوانی چاہیے۔ خسرہ  
کے خلاف دو خوراکیں 97 فیصد موثر ہیں۔



CDPH Immunization کلینک  
Chicago کے تمام رہائشیوں کو خدمات  
فراہم کرتے ہیں۔ آپ سے رہائش کا ثبوت  
دکھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔

[CHICAGO.GOV/VACCINES](http://CHICAGO.GOV/VACCINES)



اگر آپ کو کسی دوسرے ویکسین فراہم  
کنندہ کی شناخت میں مدد کی ضرورت  
ہو تو، براہ کرم ملاحظہ کریں:  
[VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/](http://VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/)



## خسرہ انتہائی

### متعدی بیماری ہے

جب کوئی متاثرہ شخص کھانستا  
ہے یا چھینکتا ہے، تو ہوا کے  
ذریعے پھیلتا ہے۔ خسرہ کا شکار  
ایک شخص اپنے آس پاس کے  
10 میں سے 9 ایسے لوگوں  
میں اسے پھیلا سکتا ہے جن کو  
ویکسین نہیں دی گئی ہے۔



[CHICAGO.GOV/MEASLES](http://CHICAGO.GOV/MEASLES)