



# TRANQ DOPE:

## Xilacina en el suministro de drogas



**“TRANQ” es el término de jerga para los opiáceos mezclados con xilacina.**

La xilacina es un sedante para animales no aprobado para su uso en humanos.

- La xilacina **NO** es un opiáceo por lo que no responde a la naloxona (Narcan).
- Igual debe administrar naloxona si alguien sufre una sobredosis, ya que invertirá los efectos de cualquier sobredosis de opiáceos.

### ¿CÓMO LO HARÁ SENTIR LA XILACINA?

Podrá sentir los efectos de la xilacina 1 a 2 minutos después de consumirla. Los efectos pueden durar más de 4 horas.

- Fuerte sedación/inclinación profunda de la cabeza especialmente en los primeros 20 a 30 minutos después del uso
- Disminución del ritmo cardíaco, la presión y la frecuencia respiratoria
- Boca seca
- **Úlceras en la piel** — heridas grandes, graves y con mala cicatrización; la piel puede estar ennegrecida y muerta
- Sensación de mareo, cansancio, debilidad o confusión causada por un descenso rápido del azúcar en sangre y una posible anemia

### MUERTES POR SOBREDOSIS DEBIDAS A LA XILACINA EN CHICAGO

2019	21
2020	23
2021	89
2022	112

FUENTE: Datos provisionales de víctimas mortales en Chicago con xilacina como causa principal del Portal de datos abiertos del forense del condado de Cook. Datos al 03/15/2023 y sujetos a cambios.

El uso de xilacina puede causar **heridas en la piel** que pueden requerir un cuidado complicado de las heridas:

- Pueden aumentar de tamaño y tener piel y tejidos muertos
- Pueden aparecer en lugares asociados a la inyección, en lugares no asociados a la inyección y en personas que no se inyectan en absoluto (a menudo en piernas, antebrazos)
- No son infecciosas, pero pueden infectarse
- No se curan bien o rápidamente

Cómo tratar las heridas asociadas al uso de xilacina:

- Si es posible, reduzca el uso de xilacina o deje de usarla
- No se quite la piel
- Mantenga la herida lo más limpia posible con agua y jabón
- Vaya al médico inmediatamente



# TRANQ DOPE:

Xilacina en el suministro de drogas



## ¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA XILACINA?

La mayor parte de la xilacina está en las drogas o en el suministro de opiáceos en general, pero hay informes de sobredosis mortales que incluyen a la xilacina y cocaína, metanfetamina y benzodiazepinas.

## ¿Qué hacer en caso de sobredosis con xilacina?

- Administre naloxona. **NOTA:** La xilacina **NO** responde a la naloxona (Narcan) pero es importante administrar naloxona para revertir los efectos de los opiáceos involucrados en la sobredosis.
- Llame al 911.
- Ponga a la persona en posición de recuperación, intente despejar las vías respiratorias.
- Si está cómodo, intente la maniobra de resucitación cardiopulmonar.

*No existe ningún antídoto para la sobredosis de xilacina que esté aprobado para su uso en humanos.*

## Recursos

- Para obtener naloxona (Narcan) gratis, visite cualquier sede de Chicago Public Library [bit.ly/FindNarcan](http://bit.ly/FindNarcan)
- Para obtener suministros gratis para un uso más seguro, como jeringas, kits para esnifar, kits para fumar, kits para pruebas de fentanilo, pruebas de VIH y hepatitis C y naloxona nasal/IM (Narcan), comuníquese con Chicago Recovery Alliance: **(773) 367-3771**
- Para un tratamiento inmediato del trastorno por consumo de opiáceos disponible para todas las personas (sin necesidad de seguro, ID o documentación) **LLAME AL 833-234-6343** y pregunte por **MAR NOW**. Este servicio está disponible 24/7, y hay transporte.
- Envíe un correo electrónico a [osu.cdph@cityofchicago.org](mailto:osu.cdph@cityofchicago.org) para obtener kits de prueba de fentanilo y Narcan.

**NOTA:** El síndrome de abstinencia a la xilacina puede durar de varios días a semanas, y el síntoma principal es la ansiedad grave.