

Datos del Fentanilo

- El fentanilo es un opioide **50 veces más potente que la heroína.**
- Cuando se fabrica ilegalmente, el fentanilo viene en un **polvo blanco / gris** que se puede inyectar, fumar o inhalar.
- El fentanilo se encuentra en la **metanfetamina, cocaína, heroína y ciertas pastillas.**
- **En una sobredosis de fentanilo, se necesita una mayor cantidad de naloxona (Narcan) para revertir la sobredosis.**
 - El fentanilo **NO** es resistente a la naloxona (Narcan).
 - **NO PUEDE** sufrir una sobredosis al simplemente tocar el fentanilo.
 - Si la primera dosis de naloxona no revierte los síntomas de sobredosis en 2-3 minutos, administre una segunda dosis.
- **Para reducir el riesgo de sobredosis:** use sus sustancias lentamente, use menos y espacie las dosis; use en la presencia de otros y siempre tenga naloxona (Narcan) disponible.
- **Los signos de una sobredosis incluyen:** respiración lenta y superficial, asfixia, cuerpo flácido, piel pálida / azul / fría, quedarse dormido o falta de conciencia y pupilas muy pequeñas. **Llame al 911 si cree que alguien está sufriendo una sobredosis.**



Llame a la Línea de
Ayuda de Opioides de Illinois:
1-833-2-FINDHELP

Datos del Fentanilo

- El fentanilo es un opioide **50 veces más potente que la heroína.**
- Cuando se fabrica ilegalmente, el fentanilo viene en un **polvo blanco / gris** que se puede inyectar, fumar o inhalar.
- El fentanilo se encuentra en la **metanfetamina, cocaína, heroína y ciertas pastillas.**
- **En una sobredosis de fentanilo, se necesita una mayor cantidad de naloxona (Narcan) para revertir la sobredosis.**
 - El fentanilo **NO** es resistente a la naloxona (Narcan).
 - **NO PUEDE** sufrir una sobredosis al simplemente tocar el fentanilo.
 - Si la primera dosis de naloxona no revierte los síntomas de sobredosis en 2-3 minutos, administre una segunda dosis.
- **Para reducir el riesgo de sobredosis:** use sus sustancias lentamente, use menos y espacie las dosis; use en la presencia de otros y siempre tenga naloxona (Narcan) disponible.
- **Los signos de una sobredosis incluyen:** respiración lenta y superficial, asfixia, cuerpo flácido, piel pálida / azul / fría, quedarse dormido o falta de conciencia y pupilas muy pequeñas. **Llame al 911 si cree que alguien está sufriendo una sobredosis.**



Llame a la Línea de
Ayuda de Opioides de Illinois:
1-833-2-FINDHELP