



TRANQ :

la xylazine dans l'approvisionnement en médicaments



« TRANQ » est un terme d'argot qui désigne des opioïdes mélangés à de la xylazine

La xylazine est un sédatif vétérinaire dont l'utilisation n'est pas approuvée chez les humains.

- La xylazine n'est PAS un opioïde, elle ne répond donc pas à la naloxone (Narcan)
- Vous devez quand même administrer de la naloxone en cas d'overdose car elle annule les effets de toute overdose aux opioïdes

QUELS SONT LES EFFETS DE LA XYLAZINE ?

Vous ressentirez les effets de la xylazine 1 à 2 minutes après en avoir consommé. Ces effets peuvent durer plus de 4 heures.

- Forte sédation/somnolence, en particulier dans les 20–30 premières minutes après la consommation
- Baisse de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du rythme respiratoire
- Bouche sèche
- **Ulcères cutanés** — grandes et graves lésions qui ne guérissent pas, peau éventuellement noircie et morte
- Sensations d'étourdissements, de fatigue, de faiblesse ou de confusion causées par une baisse brutale de la glycémie et une possible anémie

DÉCÈS PAR OVERDOSE DUS À LA XYLAZINE À CHICAGO

2019	21
2020	23
2021	89
2022	112

SOURCE : données provisoires sur les décès à Chicago dont la cause principale est la xylazine, issues du portail des données ouvertes du médecin légiste du comté de Cook. Données au 15/03/2023 et peuvent être sujettes à des modifications.

L'utilisation de xylazine peut provoquer de graves **plaies cutanées** susceptibles d'exiger des soins complexes :

- Peuvent s'élargir et contenir de la peau et des tissus morts
- Peuvent être rencontrées sur des zones associées ou non à l'injection et chez des personnes qui ne se piquent pas du tout (souvent au niveau des jambes, des avant-bras)
- Ne sont pas infectieuses, mais peuvent s'infecter
- Guérissent mal ou lentement

Comment gérer les plaies associées à la consommation de xylazine :

- Si possible, réduire ou arrêter la xylazine
- Ne pas se gratter
- Maintenir la propreté de la plaie en la nettoyant avec de l'eau et du savon
- Consulter immédiatement un médecin



TRANQ :

la xylazine dans l'approvisionnement en médicaments



OÙ TROUVER DE LA XYLAZINE ?

La plupart de la xylazine se trouve dans l'approvisionnement global en drogues et/ou en opioïdes, mais des overdoses fatales impliquant de la xylazine et de la cocaïne, de la méthamphétamine et des benzodiazépines ont été signalées

Que faire en cas d'overdose impliquant de la xylazine ?

- Administrer de la naloxone. REMARQUE : la xylazine NE répond PAS à la naloxone (Narcan), mais il est important d'administrer de la naloxone pour annuler les effets des opioïdes impliqués dans l'overdose
- Appeler le 911
- Placer la victime en position latérale de sécurité, tenter de dégager les voies respiratoires
- Si vous êtes à l'aise pour le faire, tenter la respiration de sauvetage

Il n'existe pas d'antidote pour l'overdose à la xylazine dont l'utilisation est approuvée chez les humains.

Ressources

- Pour obtenir gratuitement de la naloxone (Narcan), se rendre dans n'importe quelle bibliothèque publique de Chicago bit.ly/FindNarcan
- Pour obtenir gratuitement du matériel plus sûr, notamment des seringues, des kits pour sniffer ou fumer, des kits de test de fentanyl, des tests VIH et Hép-C et de la naloxone (Narcan) nasale/IM, contacter la Chicago Recovery Alliance au : **(773) 367-3771**
- Pour bénéficier immédiatement d'un traitement des troubles liés à la consommation d'opioïdes accessible à tous (pas d'assurance, carte d'identité ou autre document requis) **APPELER LE 833-234-6343** et demander le service **MAR NOW**. Ce service est disponible 24 h/24, 7 j/7 et comprend le transport.
- Envoyer un e-mail à osu.cdph@cityofchicago.org pour obtenir des kits de test de fentanyl et du Narcan.

REMARQUE : le sevrage de la xylazine peut durer plusieurs jours voire plusieurs semaines, et son principal symptôme est une forte anxiété