

COVID-19 चिकित्साय

ओरल और IV एंटीवायरल

Paxlovid

Molnupiravir

Remdesivir

मोनोक्लोनल एंटीबॉडी

Bebtelovimab

प्री-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस

Evusheld

टुट्ट और चिंता कम करें।
और अस्पताल में भर्ती हों

मास्क

अलग
करना

जांच

अपने स्वास्थ्य देखभाल
प्रदाता से संपर्क करें

COVID-19 टीकाकरण से
अप-टू-डेट रहें

किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की आवश्यकता है?

समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढूँढने के लिए findahealthcenter.hrsa.gov
पर जाएं या सहायता के लिए 312-746-4835 पर कॉल करें।

COVID-19 चिकित्सीय

यदि आप घर में की गई जांच सहित COVID-19 पॉज़िटिव पाए जाते हैं और 65 वर्ष या उससे अधिक के हैं एवं साथ ही साथ आप किसी ऐसी अवस्था में हैं, जो आपके COVID-19 के प्रभाव को और बढ़ा सकती है तो उपचार के दूसरे विकल्पों पर चर्चा करने के लिए तुरंत एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें। **अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को कम करने के लिए लक्षणों के शुरू होने के तुरंत बाद उपचार शुरू किया जाना चाहिए।**

यदि आपके पास कोई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नहीं है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फ़ार्मसी क्लिनिक खोजने के लिए

aspr.hhs.gov/TestToTreat पर जाएं या **1-800-232-0233** पर कॉल करें (TTY 1-888-720-7489, विकलांगता सूचना और एक्सेस लाइन 1-888-677-1199), जो आपका मूल्यांकन कर सके और यदि आप पात्र हैं, तो आपको उपचार प्रदान कर सके।

COVID-19 के उपचार में शामिल हैं:

ओरल और IV एंटीवायरल पैक्सलोविड (Paxlovid) और मोल्लुपिराविर (Molnupiravir) गोलियों को आपको खाना है और ये गोलियां आपको आपके लक्षणों की शुरुआत के 5 दिनों के भीतर लेनी होगी। **रेमडेसिविर (Remdesivir)** IV इन्फ़्यूजन द्वारा एक नस के माध्यम से दिया जाता है और इसे आपके लक्षणों के शुरू होने के 7 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए।

मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (बेबटेलोविमैब (Bebtelovimab)) प्रयोगशाला में बने प्रोटीन होते हैं, जो वायरस से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता की भांति ही प्रभावी होते हैं। वे IV इन्फ़्यूजन द्वारा एक नस के माध्यम से दिया जाता है और इन्हें आपके लक्षणों के शुरू होने के 7 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए।

प्री-एक्सपोज़र प्रोफ़िलैक्सिस एवुशेल्ड (Pre-exposure Prophylaxis Evusheld) एक रोगनिरोधी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है। यह उन व्यक्तियों के लिए है, जो COVID-19 से संक्रमित नहीं हैं और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम है या जिन्हें COVID-19 का टीका नुकसानदेह (जैसे, गंभीर एलर्जी होना) साबित हुआ है और उसके चलते उन्हें टीका न लगवाने का सुझाव दिया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया [chi.gov/therapeutics](https://www.chi.gov/therapeutics) पर जाएं