

COVID-19 치료



마스크

절연

검사

의료 제공자와
연계하세요

COVID-19 예방 접종에
대한 최신 정보 받기

의료 제공자가 필요하십니까?

findahealthcenter.hrsa.gov에서 지역보건 센터를 찾아보거나
312-746-4835로 전화하여 도움을 요청하십시오.

COVID-19 치료

가정 검사를 포함하여 65세 이상 또는 중대한 COVID-19 결과의 위험이 높은 기초 질환이 있는 경우 즉시 의료 제공자에게 연락하여 치료 옵션을 논의하십시오. **입원 및 사망 위험을 줄이기 위해 증상이 시작된 직후에 치료를 받아야 합니다.**

의료 제공자가 없는 경우 aspr.hhs.gov/TestToTreat을 방문하거나 **1-800-232-0233** (1-888-720-7489, 장애 정보 및 액세스 회선 1-888-677-1199)으로 전화를 걸어 여러분을 평가할 수 있는 지역 보건 센터 또는 약국 진료소를 찾고 자격이 있는 경우 치료를 받으십시오.

COVID-19 치료에는 다음이 포함됩니다.

구강 및 정맥주사 항바이러스제인 팍스로비드(Paxlovid)와 몰누피라비르(molnupiravir)는 경구 복용하는 알약으로 증상이 시작된 지 5일 이내에 복용해야 한다.

렘데시비르(Remdesivir)는 정맥 주사를 통해 투여되며 증상이 시작된 후 7일 이내에 투여되어야 합니다.

단클론항체(벵텔로피맙, Bebtelovimab)는 바이러스를 퇴치하는 면역계의 능력을 모방하여 실험실에서 만들어진 단백질입니다. 정맥 주사를 통해 투여되며 증상이 시작된 후 7일 이내에 투여되어야 합니다.

노출전 예방제인 이부실드는(Evusheld) COVID-19에 감염되지 않았고, 중간에서 심각한 면역 저하가 있거나, COVID-19 백신에 대한 심각한 부작용(예: 심각한 알레르기 반응)의 이력으로 인해 백신 접종을 권장하지 않는 사람들을 위한 예방적 단일 클론 항체 치료제입니다.

자세한 사항은 웹사이트 chi.gov/therapeutics를 방문하세요