

# LEKI NA COVID-19

Doustne i dożylnie leki przeciwwirusowe

Paxlovid

Molnupiravir

Remdesivir

Przeciwciała monoklonalne

Bebtelovimab

Profilaktyka przedekspozycyjna

Evusheld

Lagodniejszy przebieg  
i niższe ryzyko hospitalizacji

Maseczka

Izolacja

Test

Kontakt ze  
świadczoniodawcą

Bądź na bieżąco z  
informacjami dotyczącymi  
szczypten na COVID-19

## Szukasz świadczeniodawcy?

Wejdź na [findahealthcenter.hrsa.gov](https://findahealthcenter.hrsa.gov), aby znaleźć lokalny ośrodek zdrowia lub poproś o pomoc pod numerem 312-746-4835.

# Leki na COVID-19

Jeśli wynik testu na COVID-19, w tym testu domowego, jest dodatni, a pacjent ma co najmniej 65 lat lub cierpi na chorobę podstawową, która zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, powinien niezwłocznie skontaktować się ze świadczeniodawcą w celu omówienia możliwości leczenia.

**Leczenie należy podjąć wkrótce po wystąpieniu objawów, aby zmniejszyć ryzyko hospitalizacji i zgonu.**

Osoby, które nie mają swojego świadczeniodawcy, mogą wejść na stronę [aspr.hhs.gov/TestToTreat](https://aspr.hhs.gov/TestToTreat) lub zadzwonić pod numer **1-800-232-0233** (TTY 1-888-720-7489, infolinia dla osób niepełnosprawnych 1-888-677-1199), aby znaleźć lokalny ośrodek zdrowia lub poradnię farmaceutyczną, która dokona oceny stanu zdrowia i w razie potrzeby skieruje na leczenie.

## Metody leczenia COVID-19:

**DOUSTNE I DOŻYLNIE LEKI PRZECIWWIRUSOWE** Paxlovid i molnupiravir to tabletki, które przyjmuje się doustnie w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów. Remdesivir podaje się w ciągu 7 dni od momentu wystąpienia objawów w infuzji dożylniej.

**PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE** (Bebtelovimab) to laboratoryjnie wytworzone białka, które naśladują zdolność układu odpornościowego do zwalczania wirusa. Podaje się je w ciągu 7 dni od momentu wystąpienia objawów w infuzji dożylniej.

**PROFILAKTYKA PRZEDEKSPozyCYJNA** Evusheld służy do profilaktycznej terapii przeciwciałami monoklonalnymi u osób niechorujących na COVID-19 z umiarkowanym lub ciężkim upośledzeniem odporności lub u których szczepienie nie jest zalecane ze względu na ciężkie reakcje niepożądane (np. ciężkie reakcje alergiczne) na szczepionki na COVID-19 w wywiadzie.

**Więcej informacji:** [chi.gov/therapeutics](https://chi.gov/therapeutics)