

COVID-19 کی ٹیکہ کاری سے متعلق باخبر رہیں

ماسک علیحدگی ٹیسٹ فراہم کنندہ سے جڑیں۔

نگہداشت صحت فراہم کنندہ درکار ہے؟ findahealthcenter.hrsa.gov پر جا کر کمبونٹی ہیلتھ سنٹر تلاش کریں اعانت کے لیے 4835–746-312 پر کال کریں۔



COVID-19 کے معالجات

اگر COVID-19 کا آپ کا ٹیسٹ، بشمول گھر پر کیا جانے والا ٹیسٹ مثبت آیا اور آپ کی عمر 65 سال یا اس سے زائد ہے اور کوئی ایسی خفتہ کیفیت لاحق ہے جو آپ کی عمر 65 سال یا اس سے زائد ہے اور کوئی ایسی خفتہ کیفیت لاحق ہے جو اسی وقت آپ کو COVID-19 کے شدید نتائج کے زیادہ خطرے میں ڈالتی ہے تو، اسی وقت نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے رابطہ کرکے معالجاتی اختیار ات پر گفتگو کریں۔ آپ کی علامات شروع ہونے کے بعد جلد ہی معالجے شروع ہو جائیں تاکہ ہسپتال میں بھرتی اور موت واقع ہونے کا آپ کا خطرہ کم کرنے میں مدد ملے۔

اگر آپ کے پاس نگہداشت صحت فراہم کنندہ نہیں ہے تو،

aspr.hhs.gov/TestToTreat پر جانیں یا 1-800-232

(7489-720-788) TTY، معذوری سے متعلق معلومات اور رسائی لائن 677-199-1888) پر رابطہ کرکے کمیونٹی بیلتھ سنٹر

یا فارمیسی کلینک تلاش کریں جو آپ کا جائزہ لے سکتے اور ، اگر آپ اہل ہوں تو ، معالجے سے آپ کو جوڑ سکتے ہیں۔

COVID-19 کے معالجوں میں شامل ہیں:

کھانی جانے والی اور IV اینٹی وائرل دوائیں پیکسلووڈ (Paxlovid) اور ملنوپیر اور (molnupiravir) گولیاں ہیں جو آپ منہ کے راستے لیتے ہیں اور آپ کی علامات شروع ہونے سے 5 دنوں کے اندر لینا ضروری ہے۔ ریمڈیسیور (Remdesivir) رگ میں IV انفیوڑن کے ذریعے دی جاتی ہے اور آپ کی علامات شروع ہونے سے 7 دنوں کے اندر دینا ضروری ہے۔

مونوکلونل اینٹی باڈیز (بیبٹیلوویمیب (Bebtelovimab)) لیباریٹری کے تیار کردہ پروٹین ہیں جو وائرس سے لڑنے کی آپ کے نظام مامونیت کی اہلیت کی نقالی کرتی ہیں۔ وہ رگ کی معرفت ۱۷ انفیوڑن کے ذریعے دی جات ہیں اور آپ کی علامات شروع ہونے سے 7 دنوں کے اندر دینا ضروری ہے۔ قبل از ابتلاء پروفائلیکسس ایووشیلڈ (Prophylaxis Evusheld)ان لوگوں کے لیے ایک تدار کی مونوکلونل اینٹی باڈی تھراپی ہے جو COVID-19) سے متاثر نہیں اور جن کی مامونیت سے معتدل تک شدید سمجھوتہ ہوا ہے، یا جن لوگوں کو COVID-19

مزید معلومات کے لیے براہ کرم chi.gov/therapeutics ملحظہ کریں

ردعمل) کے سرگزشت کے سبب ٹیکہ کاری کی تجویز نہیں کی جاتی ہے۔