

COVID-19 治疗

口服和静脉注射抗病毒药

Paxlovid

Molnupiravir

Remdesivir

单株抗体

Bebtelovimab

暴露前预防

Evusheld

缓解严重程度
和减少住院

口罩

隔离

检测

与您的医疗保健提供者联系

获取有关 COVID-19 疫苗接种的最新信息

需要医疗保健提供者?

请访问 findahealthcenter.hrsa.gov, 以寻找社区健康中心, 或者致电 312-746-4835 获取帮助。

COVID-19 治疗

如果您的 COVID-19 检测呈阳性，包括居家检测，且年龄在 65 岁或以上，或患有可能导致您面临严重 COVID-19 结果的高风险基础性疾病，请立即与医疗保健提供者联系，以讨论治疗方案。**一旦开始出现症状，必须立即进行治疗，以帮助降低住院和死亡的风险。**

如果您没有医疗保健提供者，请访问

aspr.hhs.gov/TestToTreat，或致电 **1-800-232-0233**

(TTY 1-888-720-7489，残障信息和访问热线 1-888-677-1199)，寻找社区健康中心或药房诊所，以进行检测评估，如果您检测呈阳性，您将接受治疗。

COVID-19 治疗方案包括：

口服和静脉注射抗病毒药 Paxlovid 和 molnupiravir 是药片，可口服，必须在出现症状后 5 天内服用。Remdesivir 需通过静脉注射，必须在出现症状后 7 天内给药。

单株抗体 (Bebtelovimab) 是实验室自制蛋白质，作用原理是模仿免疫系统抵抗病毒。单株抗体需通过静脉注射，必须在出现症状后 7 天内给药。

暴露前预防 Evusheld 是一种预防性单株抗体疗法，适用于未感染 COVID-19 和中度至重度免疫系统受损，或因对 COVID-19 疫苗有严重不良反应(如严重过敏反应)史而不推荐接种疫苗的患者。

有关更多信息，请访问 **chi.gov/therapeutics**